

レジメン名称【 D-00042 】				大腸がん	
Encorafenib/Cetuximab/FOLFOX					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
アービタックス	[Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1
エルプラット	[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
ビラフトビ	[Encorafenib]	300mg		内服	Day1-14
備考					
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察					
Encorafenib 300mg/回 1日1回 BRAF変異を有する場合 アービタックス中止時は中止					
Rp5.6は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分 (注)
	アービタックス	500mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	エルプラット	85mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑦	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
8	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称【 D-00041 】	大腸がん				
Encorafenib/Cetuximab (2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1,8,15
	ビラフトビ [Encorafenib]	300mg		内服	Day1-7
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称	【 D-00040 】	大腸がん			
Encorafenib/Cetuximab (初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	400mg/m ²		点滴	Day1,8,15
	ビラフトビ [Encorafenib]	300mg		内服	Day1-7
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	アービタックス	400mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00039 】				大腸がん	
IRIS/Bevacizumab (3週間間隔)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン [BEV]	7.5mg/kg		点滴	Day1
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	7.5mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00038 】				大腸がん	
S-1(4投2休)/Bevacizumab					
1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン [BEV]	5mg/kg		点滴	Day1,15,29
	S-1			内服	Day1夕食後-Day29朝食後
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	5mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00037 】				大腸がん	
SOX/Cetuximab (2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1,8,15
	エルブラット [L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ピスマラー1mg	1A	30分
	グラニセトン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ピスマラー1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00036 】				大腸がん	
SOX/Cetuximab (初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	400mg/m ²		点滴	Day1,8,15
	エルブラット [L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	アービタックス	400mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00027 】 UFT/LV/Bevacizumab 1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			大腸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名〔略号〕	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アバスチン〔BEV〕	5mg/kg		点滴 Day11,15
	UFT			内服 Day1-Day21
	LV			内服 Day1-Day21
フルオロウラシル BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与 UFT 300mg/m ² /day 分3 <1.17m ² :300mg/day 1.17~1.49m ² :400mg/day 1.50~1.83m ² :500mg/day >1.83m ² :600mg/day LV 75mg/day				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	5mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00034 】					大腸がん	
Pertuzumab/Trastuzumab（2回目以降）						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ [Pertuzumab]		420mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン [Trastuzumab]		6mg/kg		点滴	Day1
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	60分（注）
	パージェタ	420mg/body	
③	生理食塩液	100ml	30分
④	生理食塩液	250ml	90分（注）
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00033 】				大腸がん	
Pertuzumab/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ [Pertuzumab]	840mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン [Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	パージェタ	840mg/body	
③	生理食塩液	100ml	30分
④	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	8mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00032 】				大腸がん		
Bevacizumab/Cap						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン	〔BEV〕	7.5mg/kg		点滴	Day1
	ゼローダ	〔Cap 〕			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	7.5mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00031 】				大腸がん	
Cetuximab/Encorafenib/Binimetinib（2回目以降）					
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アービタックス	[Cetuximab]	250mg/m ²		点滴 Day1
	ビラフトビ	[Encorafenib]	300mg		内服 Day1-7
	メクトビ	[Binimetinib]	90mg		内服 Day1-7
フルオロウラシル					
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察					
Encorafenib 300mg/回 1日1回 BRAF変異を有する場合					
Binimetinib 45mg/回 1日2回 BRAF変異を有する場合					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	
	アービタックス	250mg/m ²	60分（注）
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称 【 D-00030 】				大腸がん	
Cetuximab/Encorafenib/Binimetinib（初回）					
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アービタックス	[Cetuximab]	400mg/m ²		点滴 Day1
	ビラフトビ	[Encorafenib]	300mg		内服 Day1-7
	メクトビ	[Binimetinib]	90mg		内服 Day1-7
フルオロウラシル					
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察					
Encorafenib 300mg/回 1日1回 BRAF変異を有する場合					
Binimetinib 45mg/回 1日2回 BRAF変異を有する場合					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	500ml	
	アービタックス	400mg/m ²	120分（注）
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称【 D-00029 】					大腸がん	
CPT-11/Panitumumab						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン	[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1.15
	ベクティビックス	[Panitumumab]	6mg/kg		点滴	Day1.15
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	ベクティビックス	6mg/kg	
④	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00028 】				大腸がん	
SOX					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エルプラット [L-OHP]	130mg/㎡		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00027 】				大腸がん	
TAS-102 /Bevacizumab					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン [BEV]	5mg/kg		点滴	Day1
	ロンサーフ [TAS-102]			内服	Day1夕食後-Day6朝食後 Day8夕食後-Day13朝食後
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	5mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00026 】				大腸がん	
mFOLFOXIRI/Bevacizumab					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン[BEV]	5mg/kg		点滴	Day1
	エルプラット[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	イリノテカン [CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Rp4.5は同時投与					
Day1-3アプレピタント内服					
好中球減少があればC P T-11を優先して減量					
血小板減少、末梢神経障害があればL-OHPを優先して減量					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	5mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 D-00025 】				大腸がん	
mFOLFOXIRI					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エルプラット[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	イリノテカン [CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
フルオロウラシル					
Rp4.5は同時投与					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称【 D-00024 】				大腸がん	
FOLFIRI/Aflibercept					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ザルトラップ【AFL】	4mg/kg		点滴	Day1
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/㎡		点滴	Day1
	5-FU	400mg/㎡		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/㎡		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
AFL PVCフリー輸液セット使用 インラインフィルター使用					
Rp5.6は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	ザルトラップ	4mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3			
①	ヘパリンロック	10単位	

レジメン名称 【 D-00023 】				大腸がん	
SOX/Bevacizumab					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン [BEV]	7.5mg/kg		点滴	Day1
	エルブラット [L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	7.5mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00022 】				大腸がん		
5-FU /LV/ Bevacizumab						
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン	〔BEV〕	5mg/kg		点滴	Day1
	5-FU		400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	5-FU		2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
フルオロウラシル						
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	5mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称【 D-00021 】				大腸がん		
IRIS/Bevacizumab						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン	[BEV]	5mg/kg		点滴	Day1.15
	イリノテカン	[CPT-11]	100mg/m ²		点滴	Day1.15
	S-1				内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル						
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与						
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25～1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回						
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	5mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00020 】				大腸がん		
IRIS						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]		125mg/㎡		点滴	Day1.15
	S-1				内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	125mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00019 】 CPT-11/Cetuximab（2回目以降） 1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）				大腸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1.8.15.22.29.36
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1.15.29
備考 フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15.29			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.22.36			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称 【 D-00018 】 CPT-11/Cetuximab（初回） 1クール 42日（1クールに休薬期間を含む）				大腸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アービタックス	[Cetuximab]	400mg/m ²		点滴 Day1
	アービタックス	[Cetuximab]	250mg/m ²		点滴 Day8.15.22.29.36
	イリノテカン	[CPT-11]	150mg/m ²		点滴 Day1.15.29
フルオロウラシル					
Cetuximab投与後1時間は経過観察					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分（注）
	アービタックス	400mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.22.36			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

Day15.29			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00017 】					大腸がん	
CPT-11						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン	[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1.15
備考						

フルオロウラシル

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00016 】					大腸がん	
Cetuximab (2回目以降)						
1クール 7日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス	[Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1
備考						
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察						

フルオロウラシル

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称【 D-00015 】					大腸がん	
Cetuximab (初回)						
1クール 7日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス	[Cetuximab]	400mg/m ²		点滴	Day1
備考						
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察						

フルオロウラシル

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	500ml	120分 (注)
	アービタックス	400mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称 【 D-00014 】					大腸がん	
Panitumumab						
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
ベクティビックス [Panitumumab]			6mg/kg		点滴	Day1
備考						
インラインフィルター使用						

フルオロウラシル

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	60分
	ベクティビックス	6mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 D-00013 】				大腸がん	
XELOX/Bevacizumab					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン [BEV]	7.5mg/kg		点滴	Day1
	エルプラット [L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	ゼローダ [Cap]	2000mg/m ²		内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	7.5mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00012 】				大腸がん	
XELOX					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エルプラット[L-OHP]	130mg/㎡		点滴	Day1
	ゼローダ [Cap]	2000mg/㎡		内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 D-00011 】				大腸がん	
FOLFIRI /Ramucirumabucirumab					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	サイラムザ [Ramucirumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
インラインフィルター使用					
Rp5.6は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	サイラムザ	8mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 D-00010 】				大腸がん	
FOLFIRI Cetuximab（2回目以降）					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1-8
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
Cetuximab投与後1時間は経過観察					
Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3			
①	ヘパリンロック	10単位	

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称 【 D-00009 】				大腸がん	
FOLFIRI Cetuximab（初回）					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
アービタックス	[Cetuximab]	400mg/m ²		点滴	Day1
アービタックス	[Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day8
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
Cetuximab投与後1時間は経過観察					
Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分（注）
	アービタックス	400mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分（注）
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称【 D-00008 】				大腸がん	
FOLFIRI/Panitumumab					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ベクティビックス [Panitumumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
インラインフィルター使用					
Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	ベクティビックス	6mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称【 D-00007 】				大腸がん	
FOLFIRI/Bevacizumab					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン【BEV】	5mg/kg		点滴	Day1
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/㎡		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/㎡		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/㎡		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	5mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 D-00006 】				大腸がん	
FOLFIRI					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
	5-FU	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
フルオロウラシル					
Rp3.4は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキササート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	イリノテカン	150mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 D-00005 】				大腸がん	
mFOLFOX6 Cetuximab (2回目以降)					
1クール 14日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アービタックス [Cetuximab]	250mg/m ²		点滴	Day1.8
	エルプラット[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴 (ポーラス)	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴 (ポンプ)	Day1-3
備考					
Cetuximab投与後 1 時間は経過観察					
Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	アービタックス	250mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	エルプラット	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称 【 D-00004 】 mFOLFOX6 Cetuximab (初回) 1クール 14日 (1クールに休薬期間を含む)				大腸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
アービタックス [Cetuximab]		400mg/m ²		点滴	Day1
アービタックス [Cetuximab]		250mg/m ²		点滴	Day8
エルプラット[L-OHP]		85mg/m ²		点滴	Day1
フルオロウラシル		400mg/m ²		点滴 (ポーラス)	Day1
フルオロウラシル		2400mg/m ²		点滴 (ポンプ)	Day1-3
備考 Cetuximab投与後 1 時間は経過観察 Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分 (注)
	アービタックス	400mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	エルプラット	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3

①	ヘパリンロック	10単位
---	---------	------

Day8

①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	アービタックス	250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	60分

レジメン名称 【 D-00003 】 mFOLFOX6/Panitumumab 1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					大腸がん			
抗悪性腫瘍剤		商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日	
		ペクティビックス		[Panitumumab]	6mg/kg		点滴	Day1
		エルプラット		[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
		フルオロウラシル			400mg/m ²		点滴（ポース）	Day1
		フルオロウラシル			2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考 Rp4.5は同時投与 インラインフィルター使用								

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキササート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	ペクティビックス	6mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	エルプラット	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 D-00002 】 mFOLFOX6/Bevacizumab 1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）				大腸がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アバスチン [BEV]	5mg/kg		点滴	Day1
	エルプラット[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考 BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与 Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	5mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	エルプラット	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 D-00001 】				大腸がん	
mFOLFOX6					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エルプラット[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	5-FU	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
フルオロウラシル					
Rp3.4は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位