

レジメン名称 【 S-00039 】 Pembrolizumab/XELOX 1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）				胃がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	200mg		点滴	Day1
	ゼローダ [Cap]			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² ＜：2100mg/回、1.66～1.96m ² ：1800mg/回、1.36～1.66m ² ：1500mg/回、 1.36m ² ＞：1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00038 】				胃がん	
Pembrolizumab/SOX/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	200mg		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑦	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00037 】				胃がん	
Pembrolizumab/SOX/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	200mg		点滴	Day1
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	8mg/kg	
⑦	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00036 】				胃がん	
Pembrolizumab/XELOX/Trastuzumab(2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	200mg		点滴	Day1
	ゼローダ [Cap]			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、 1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑦	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00035 】				胃がん	
Pembrolizumab/XELOX/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	200mg		点滴	Day1
	ゼローダ [Cap]			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、 1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑥	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	8mg/kg	
⑦	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00034 】				胃がん	
Zolbetuximab/XELOX (2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ピロイ[Zolbetuximab]	600mg/m ²		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Zolbetuximab 30～60後まで30ml/hr その後60～100ml/hr 6時間以内終了					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66～1.96m ² : 1800mg/回、1.36～1.66m ² : 1500mg/回、					
1.36m ² > : 1200mg/回 Day1夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	パロノセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
	アロカリス225mg	1A	
③	生理食塩液	100ml	
⑤	生理食塩液	240ml	上記
	ピロイ	600mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑦	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00033 】			胃がん	
Zolbetuximab/XELOX (初回)				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ピロイ[Zolbetuximab]	800mg/m ²		点滴 Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴 Day1
	フルオロウラシル			内服 Day1夕食後-Day15朝食後
備考				
Zolbetuximab 30～60後まで50ml/hr その後100～200ml/hr 6時間以内終了				
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66～1.96m ² : 1800mg/回、1.36～1.66m ² : 1500mg/回、 1.36m ² > : 1200mg/回 Day1夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	パロノセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
	アロカリス225mg	1A	
③	生理食塩液	100ml	上記
⑤	生理食塩液	400ml	
	ピロイ	800mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑦	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00032 】 Zolbetuximab/mFOLFOX6 (2回目以降) 1クール 14日 (1クールに休薬期間を含む)				胃がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ビロイ[Zolbetuximab]	400mg/m ²		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴 (ポーラス)	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴 (ポンプ)	Day1-3
備考 Zolbetuximab 30～60分後まで25ml/hr その後50～100ml/hr 6時間以内終了 Rp5.6は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	パロノセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
	アロカリス225mg	1A	
③	生理食塩液	100ml	
④	生理食塩液	200ml	上記
	ビロイ	400mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
⑦	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑨	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 S-00031 】 Zolbetuximab/mFOLFOX6 (初回) 1クール 14日 (1クールに休薬期間を含む)				胃がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ピロイ[Zolbetuximab]	800mg/m ²		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴 (ポーラス)	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴 (ポンプ)	Day1-3
備考 Zolbetuximab 30～60後まで50ml/hr その後100～200ml/hr 6時間以内終了 Rp5.6は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートをキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	パロノセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
	アロカリス225mg	1A	
③	生理食塩液	100ml	
④	生理食塩液	400ml	上記
	ピロイ	800mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
⑦	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑧	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑨	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 S-00030 】 Nivolumab/mFOLFOX6 1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）				胃がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	240mg/body		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	5-FU	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考 Nivolumab インラインフィルター使用 Rp5.6は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	オプジーボ	360mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
⑥	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑦	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑧	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 S-00029 】			胃がん	
Nivolumab/XELOX				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	オブジーボ[Nivolumab]	360mg/body		点滴 Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴 Day1
	フルオロウラシル		内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考				
Nivolumab インラインフィルター使用				
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、 1.36m ² > : 1200mg/回 Day1夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	オブジーボ	360mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00028 】				胃がん	
Nivolumab/SOX					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	360mg/body		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	100mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day 1 夕食後-Day15朝食後
備考					
Nivolumab インラインフィルター使用					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	オプジーボ	360mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	100mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00027 】				胃がん	
XELOX/Trastuzumab(2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、 1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	6mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00026 】				胃がん	
XELOX/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、					
1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	8mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 S-00025 】				胃がん	
XELOX					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オキサリプラチン[L-OHP]	130mg/m ²		点滴	Day1
	ゼローダ [Cap]			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
Cap BSA1.96㎡< : 2100mg/回、1.66~1.96㎡ : 1800mg/回、1.36~1.66㎡ : 1500mg/回、 1.36㎡> : 1200mg/回 Day1夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	130mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00024 】				胃がん	
Nivolumab 4W					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	480mg/body		点滴	Day1
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	ビスミラー5mg	1A	
③	生理食塩液	82ml	60分
	オプジーボ	480mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 S-00023 】					胃がん	
Trastuzumab deruxtecan						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エンハーツ[T-DXd]		6.4mg/kg		点滴	Day1
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	5%ブドウ糖液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	90分
	エンハーツ	6.4mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00022 】				胃がん	
G-SOX/Trastuzumab(2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オキサリプラチン[L-OHP]	100mg/m ²		点滴	Day1
	トラスツズマブ [Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day 1 夕食後からDay15朝食後
備考					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00021 】				胃がん	
G-SOX/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オキサリプラチン[L-OHP]	100mg/m ²		点滴	Day1
	トラスツズマブ [Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day 1 夕食後からDay15朝食後
備考					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	8mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00020 】 mFOLFOX6/Trastuzumab（2回目以降） 1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）				胃がん		
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オキサリプラチン	[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	トラスツズマブ	[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	フルオロウラシル		400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	5-FU		2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考 Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与 Rp4.5は同時投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	90分（注）
	トラスツズマブ	6mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 S-00019 】 mFOLFOX6/Trastuzumab（初回） 1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）				胃がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オキサリプラチン[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	トラスツズマブ [Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	フルオロウラシル	400mg/m ²		点滴（ポーラス）	Day1
	フルオロウラシル	2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考 Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与 Rp4.5は同時投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキササート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	90分（注）
	トラスツズマブ	8mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/m ²	
⑦	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 S-00018 】				胃がん	
DTX/S-1					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル[DTX]		40mg/m ²		点滴 Day1
	S-1			内服	Day 1 夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
DTX アルコール注意					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
サイクル1：S-1 2投1休のみ サイクル2-7：上記レジメンスケジュールで実施					
サイクル8以降：S-1 4投2休 手術1年後まで繰り返す					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	40mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00017 】				胃がん	
Nivolumab					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	オプジーボ[Nivolumab]		240mg/body	点滴	Day1
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	ビスミラー5mg	1 A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	オプジーボ	240mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00016 】			胃がん	
nab-PTX/Ramucirumab				
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アブラキサン[nab-PTX]	100mg/m ²		点滴 Day1.8.15
	サイラムザ [RAM]	8mg/kg		点滴 Day1.15
フルオロウラシル				
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと				
RAM インラインフィルター使用すること				
ライン注意				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	サイラムザ	8mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	100mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00015 】					胃がん	
weekly nab-PTX						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤		商品名 【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
アブラキサン[nab-PTX]			100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00014 】				胃がん	
CDDP/Trastuzumab/TS-1（2回目以降）					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン[CDDP]	60mg/m ²		点滴	Day1
	トラスツズマブ [Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day 1 夕食後からDay15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
Day1-3 アブレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルラクト	500ml	90分
②	ソルラクト	500ml	90分
③	ソルラクト	500ml	90分
④	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑤	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑥	生理食塩液	250ml	90分（注）
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑦	マンニトール	300ml	60分
⑧	ソルラクト	500ml	90分
⑨	ソルラクト	500ml	90分

レジメン名称 【 S-00013 】				胃がん	
CDDP/Trastuzumab/TS-1（初回）					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン[CDDP]	60mg/m ²		点滴	Day1
	トラスツズマブ [Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day 1 夕食後からDay15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
Day1-3 アブレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルラクト	500ml	90分
②	ソルラクト	500ml	90分
③	ソルラクト	500ml	90分
④	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑤	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑥	生理食塩液	250ml	90分（注）
	トラスツズマブ	8mg/kg	
⑦	マンニトール	300ml	60分
⑧	ソルラクト	500ml	90分
⑨	ソルラクト	500ml	90分

レジメン名称【 S-00012 】				胃がん		
mFOLFOX6						
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	オキサリプラチン	[L-OHP]	85mg/m ²		点滴	Day1
	5-FU		400mg/m ²		点滴（ボラス）	Day1
	フルオロウラシル		2400mg/m ²		点滴（ポンプ）	Day1-3
備考						
Rp 3.4は同時投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レポホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	400mg/m ²	
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	46時間（ポンプ）
	5-FU	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 S-00011 】				胃がん	
G-SOX					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	オキサリプラチン[L-OHP]		100mg/m ²		点滴 Day1
	S-1			内服	Day 1 夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25～1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	オキサリプラチン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00010 】				胃がん	
CDDP/S-1					
1クール 35日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン[CDDP]	60mg/m ²		点滴	Day8
	S-1			内服	Day 1 夕食後-Day22朝食後
フルオロウラシル					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay22朝食後まで服用(21日間内服)					
Day8-10アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	60mg/m ²	
④	ソルアセトF	500ml	60分
	KCL	1キット	
⑤	生理食塩液	500ml	60分
	フロセミド静注20mg	1 A	

レジメン名称 【 S-00009 】				胃がん	
CPT-11/S-1 (IRIS)					
1クール 35日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]	80mg/m ²		点滴	Day1.15
	S-1			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
フルオロウラシル					
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回					
Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 S-00008 】				胃がん		
CPT-11						
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン	[CPT-11]	150mg/m ²		点滴	Day1
備考						
フルオロウラシル						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	イリノテカン	150mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00007 】				胃がん	
XP/Trastuzumab（2回目以降）					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDP]	1250mg/m ²		点滴	Day1
	フルオロウラシル			内服	Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、					
1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
Day1-3 アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルラクト	500ml	90分
②	ソルラクト	500ml	90分
③	ソルラクト	500ml	90分
④	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑤	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	80mg/m ²	
⑥	生理食塩液	250ml	90分(注)
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑦	マンニトール	200ml	60分
⑧	ソルラクト	500ml	90分
⑨	ソルラクト	500ml	90分

レジメン名称 【 S-00006 】			胃がん	
XP/Trastuzumab (初回)				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	トラスツズマブ[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴 Day1
	シスプラチン [CDDP]	1250mg/m ²		点滴 Day1
	フルオロウラシル			Day1夕食後-Day15朝食後
備考				
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与				
Cap BSA1.96m ² < : 2100mg/回、1.66~1.96m ² : 1800mg/回、1.36~1.66m ² : 1500mg/回、				
1.36m ² > : 1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)				
Day1-3 アブレピタント内服				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルラクト	500ml	90分
②	ソルラクト	500ml	90分
③	ソルラクト	500ml	90分
④	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	80mg/m ²	120分
⑥	生理食塩液	250ml	
	トラスツズマブ	8mg/kg	90分(注)
⑦	マンニトール	200ml	60分
⑧	ソルラクト	500ml	90分
⑨	ソルラクト	500ml	90分

レジメン名称 【 S-00005 】				胃がん		
weekly PTX/Trastuzumab（2回目以降）						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	トラスツズマブ [Trastuzumab]		6mg/kg		点滴	Day1
フルオロウラシル						
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	6mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00004 】				胃がん	
weekly PTX/Trastuzumab (初回)					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	トラスツズマブ [Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
フルオロウラシル					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	90分 (注)
	トラスツズマブ	8mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00001 】				胃がん		
weekly PTX/Ramucirumab						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	サイラムザ[RAM]		8mg/kg		点滴	Day1
フルオロウラシル						
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意						
RAM インラインフィルター使用						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	サイラムザ	8mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 S-00002 】				胃がん	
Ramucirumab					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	サイラムザ[RAM]		8mg/kg		点滴 Day1
備考					
フルオロウラシル					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
③	生理食塩液	250ml	60分
	サイラムザ	8mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	30分

レジメン名称 【 S-00001 】					胃がん		
weekly PTX							
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）							
抗悪性腫瘍剤		商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
		パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考							
フルオロウラシル							

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ