

レジメン名称 【 U-00017 】		尿路上皮がん	
Pembrolizumab (6週間間隔)			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	キイトルーダ[Pembrolizumab]	400mg/body	点滴 Day1
備考			
Pembrolizumab		インラインフィルター使用	
		インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	400mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00016 】		尿路上皮がん	
Nivolumab (4週間間隔)			
1クール 14日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	オプジーボ[Nivolumab]	480mg/body	点滴 Day1
備考			
Nivolumab		インラインフィルター使用	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	480mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 U-00015 】			Durvalumab		尿路上皮がん
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法	投与日
イミフィンジ [Durvalumab]			1500mg/body	点滴	Day1
備考					
インラインフィルター使用					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	1500mg/body	60分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00014 】		Durvalumab/GC (Ccr60 未満)		尿路上皮がん	
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日	
	イミフィンジ [Durvalumab]	1500mg/body	点滴	Day1	
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8.15	
	シスプラチン [CDDP]	35mg/m ²	点滴	Day1,8	
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	1500mg	60分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	35mg/m ²	120分
⑦	アセテート	500ml	5時間
⑧	マンニトール	300ml	3時間
⑨	メイロン	250ml	150分
⑩	ソルラクト	400ml	4時間

Day2,9			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑤	アセテート	500ml	5時間

Day3,10			
①	ソルラクト	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	30分
	ファモチジン20mg	1A	5時間
	デキサート3.3mg	1A	
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	アセテート	500ml	5時間

Day4,11			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	アセテート	500ml	5時間

Day8			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	35mg/m ²	120分
⑦	アセテート	500ml	5時間
⑧	マンニトール	300ml	3時間
⑨	メイロン	250ml	150分
⑩	ソルラクト	400ml	4時間

レジメン名称 【 U-00013 】		Durvalumab/GC (Ccr60 以上)		尿路上皮がん	
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名【略号】	1日投与量	投与方法	投与日	
	イミフィンジ [Durvalumab]	1500mg/body	点滴	Day1	
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8.15	
	シスプラチン [CDDP]	70mg/m ²	点滴	Day1	
備考		Day1-3アプレピタント内服			
CDDP		経口補水1000ml推奨			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	450ml	3時間
③	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	1500mg	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑥	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑦	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	70mg/m ²	120分
⑧	アセテート	500ml	5時間
⑨	マンニトール	300ml	3時間
⑩	メイロン	250ml	150分
⑪	ソルアセトF	400ml	4時間

Day2			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑤	アセテート	500ml	5時間
⑥	ソルアセトF	400ml	4時間

Day3			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分

Day4			
①	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分

Day8.15			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	アセテート	500ml	5時間

レジメン名称 【 U-00012 】		尿路上皮がん	
Enfortumab Vedotin/Pembrolizumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	パドセブ[Enfortumab Vedotin]	1.25mg/kg	点滴 Day1.8
	キイトルーダ[Pembrolizumab]	200mg/body	点滴 Day1
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	パドセブ	1.25mg/kg	30分
④	生理食塩液	100ml	
⑤	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	パドセブ	1.25mg/kg	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00011 】		Avelumab		尿路上皮がん	
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法	投与日
	バベンチオ[Avelumab]		10mg/kg	点滴	Day1
備考					
Avelumab		インラインフィルター使用			
		投与30分前にアセトアミノフェン400mg内服			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	250ml	
	バベンチオ	10mg/kg	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00010 】		尿路上皮がん	
Enfortumab Vedotin			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	パドセブ[Enfortumab Vedotin]	1.25mg/kg	点滴 Day1.8.15
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	パドセブ	1.25mg/kg	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00009 】		Nivolumab		尿路上皮がん	
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	オプジーボ[Nivolumab]		240mg/body	点滴	Day1
備考					
Nivolumab		インラインフィルター使用			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
③	生理食塩液	100ml	
	オプジーボ	240mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00008 】		尿路上皮がん	
GEM/CBDCA			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴 Day1.8
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5	点滴 Day1
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	500ml	
	カルボプラチン	AUC5	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00007 】		尿路上皮がん	
GC sh			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8
シスプラチン [CDDP]	70mg/m ²	点滴	Day1
備考	Day1-3アプレピタント内服		
CDDP	経口補水1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	ソルデム3	500ml	60分
	アスパラK	10ml	
	硫酸Mg	8ml	
⑤	生理食塩液	500ml	60分
	シスプラチン	70mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
	フロセミド静注20mg	1 A	
⑦	生理食塩液	500ml	60分
	アスパラK	10ml	
⑧	ソルラクト	500ml	60分

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00006 】		尿路上皮がん	
Pembrolizumab			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	キイトルーダ[Pembrolizumab]	200mg/body	点滴 Day1
備考			
Pembrolizumab		インラインフィルター使用	
		インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 U-00005 】		尿路上皮がん		
テラルビシン膀胱注入				
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	テラルビシン[THP]	30mg/body		Day1
備考				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	テラルビシン	30mg/body	
	注射用水	40ml	膀胱注入

レジメン名称 【 U-00004 】		尿路上皮がん	
GC split			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗癌性腫瘍剤 商品名 略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8
シスプラチン [CDDP]	35mg/m ²	点滴	Day1.8
備考	Day1-3、8-10アプレピタント内服		
CDDP	経口補水1000ml推奨		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	35mg/m ²	120分
⑤	アセテート	500ml	5時間
⑥	マンニトール	300ml	3時間
⑦	メイロン	250ml	150分
⑧	ソルラクト	400ml	4時間

Day2.9			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルラクト	500ml	5時間
③	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	1A	30分
④	ヴィーンD	500ml	5時間
⑤	アセテート	500ml	5時間

Day3.10			
①	ソルラクト	500ml	4時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	1A	30分
③	ヴィーンD	500ml	4時間
④	アセテート	500ml	4時間

Day4.11			
①	ヴィーンD	500ml	4時間
②	アセテート	500ml	4時間

レジメン名称 【 U-00003 】		尿路上皮がん	
GT			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	2500mg/m ²	点滴 Day1
	パクリタキセル [PTX]	150mg/m ²	点滴 Day1
備考			
PTX		DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用	
		アルコール注意	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ポタコールR	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	ビスミラー5mg	1 A	
	グラニセトロン1mg	1 A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	500ml	
	パクリタキセル	150mg/m ²	150分
④	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	2500mg/m ²	30分
⑤	ソルラクト	500ml	5時間

レジメン名称 【 U-00002 】			尿路上皮がん	
MVAC				
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法 投与日
メソトレキセート	[MTX]		30mg/㎡	点滴 Day1,15,22
エクザール	[VBL]		3mg/㎡	点滴 Day2,15,22
アドリアシン	[ADM]		30mg/㎡	点滴 Day2
シスプラチン	[CDDP]		70mg/㎡	点滴 Day2
備考	Day2-4アブレビタント内服			
ADM	生薬投与量	500mg/㎡		
MTX	ロイコボリン（LV）	M T X 投与3時間後に投与		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
着下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	生理食塩液	50ml	
	メソトレキセート	30mg/㎡	30分
④	アセテート	500ml	5時間
⑤	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分
⑨	ソルアセット	500ml	4時間

Day2			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分
③	ソルアセットF	500ml	5時間
④	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分
⑤	ヴィーンD	500ml	5時間
⑥	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑦	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分
⑧	生理食塩液	50ml	
	エクザール	3mg/㎡	10分
⑨	生理食塩液	50ml	
	アドリアシン	30mg/㎡	15分
⑩	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	70mg/㎡	150分
⑪	アセテート	500ml	5時間
⑫	マンニトール	300ml	3時間
⑬	メイロン	250ml	150分
⑭	ソルアセットF	500ml	4時間

Day3			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセットF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑤	アセテート	500ml	5時間
⑥	ソルアセットF	500ml	4時間

Day4			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセットF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分

Day5			
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分

Day15,22			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	50ml	
	メソトレキセート	30mg/㎡	30分
④	生理食塩液	50ml	
	エクザール	3mg/㎡	30分
⑤	アセテート	500ml	5時間
⑥	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day16,23			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分 1時
③	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分 7時
④	生理食塩液	50ml	
	ロイコボリン3mg	4A	30分 13時
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 U-00001 】			尿路上皮がん	
GC				
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法 投与日
ゲムシタビン[GEM]			1000mg/m ²	点滴 Day1.8.15
シスプラチン [CDDP]			70mg/m ²	点滴 Day1
備考			Day1-3アプレピタント内服	
CDDP			経口補水1000ml推奨	

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	450ml	3時間
③	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
④	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	70mg/m ²	
	合計500mlに調整		120分
⑥	アセテート	500ml	5時間
⑦	マンニトール	300ml	3時間
⑧	メイロン	250ml	150分
⑨	ソルアセトF	400ml	4時間

Day2			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑤	アセテート	500ml	5時間
⑥	ソルアセトF	400ml	4時間

Day3			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	ソルアセトF	500ml	5時間
③	ヴィーンD	500ml	5時間
④	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分

Day4			
①	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分

Day8.15			
①	ヴィーンD	500ml	5時間
②	生理食塩液	100ml	
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	アセテート	500ml	5時間