

レジメン名称 【 M-00060 】				乳がん	
Sacituzumab gocitecan					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	トロデルビ	[Sacituzumab gocitecan]	10mg/kg		点滴 Day1,8
備考					
Day1-3 アプレピタント内服					
投与開始30分前にカロナール400mg内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1,8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	ビスミラー1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	250ml	180分（注）
	トロデルビ	10mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00059 】				乳がん	
PTX/CBDCA (3週間間隔)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5		点滴	Day1
	パクリタキセル [PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
④	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC5	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00058 】				乳がん	
Pembrolizumab/PTX/CBDCA (3週間間隔/術前)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
キイトルーダ	[Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
カルボプラチン	[CBDCA]	AUC5		点滴	Day1
パクリタキセル	[PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					
Day1-3 アプレピタント内服					
Pembrolizumab インラインフィルター使用					
インフュージョンリアクションあればビスミラー＆カロナール投与を考慮					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
⑥	生理食塩液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5	
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00057 】				乳がん	
weeklyPTX (術前・術後)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	80mg/㎡		点滴	Day1,8,15
	フェスゴ [Pertuzumab/Trastuzumab]	10ml		点滴	Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00056 】					乳がん		
weeklyPTX/Pertuzumab/Trastuzumab(初回)							
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)							
抗悪性腫瘍剤		商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
		パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1,8,15
		フェスゴ [Pertuzumab/Trastuzumab]		10ml		点滴	Day1
備考							

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	フェスゴ MA	10ml	皮下注

レジメン名称【 M-00055 】				乳がん		
weeklyPTX/Pertuzumab/Trastuzumab(初回)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1,8,15
	フェスゴ [Pertuzumab/Trastuzumab]		15ml		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	フェスゴ IN	15ml	皮下注

レジメン名称 【 M-00054 】				乳がん		
DTX/Pertuzumab/Trastuzumab(皮下注・2回目以降)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル	[DTX]	75mg/m ²		点滴	Day1
	フェスゴ	[Pertuzumab/Trastuzumab]	10ml		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	フェスゴ MA	10ml	皮下注

レジメン名称 【 M-00053 】				乳がん		
DTX/Pertuzumab/Trastuzumab(皮下注・初回)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル	[DTX]	75mg/m ²		点滴	Day1
	フェスゴ	[Pertuzumab/Trastuzumab]	15ml		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	フェスゴ IN	15ml	皮下注

レジメン名称 【 M-00052 】				乳がん	
Pertuzumab/Trastuzumab (皮下注・2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
フェスゴ [Pertuzumab/Trastuzumab]		10ml		点滴	Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	フェスゴ MA	10ml	皮下注

レジメン名称 【 M-00051 】				乳がん	
Pertuzumab/Trastuzumab (皮下注・初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
フェスゴ [Pertuzumab/Trastuzumab]		15ml		点滴	Day1
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	フェスゴ IN	15ml	皮下注

レジメン名称 【 M-00050 】				乳がん	
weeklyPTX/Pertuzumab/Trastuzumab(2回目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	420mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	パクリタキセル[PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1,8,15
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分
	パージェタ	420mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	6mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00049 】				乳がん	
weeklyPTX/Pertuzumab/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	840mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	パクリタキセル[PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1,8,15
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分
	パージェタ	840mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	8mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8,15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー1mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00048 】			乳がん	
Trastuzumab deruxtecan				
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
エンハーツ	〔Trastuzumab deruxtecan〕	5.4mg/kg	点滴	Day1
備考				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	5%ブドウ糖液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	60分
	エンハーツ	5.4mg/kg	
④	5%ブドウ糖液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00047 】 weekly PTX/CBDCA 1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）				乳がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC1.5		点滴	Day1
	パクリタキセル [PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1
備考 PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
④	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC1.5	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00046 】 Pembrolizumab(術後) 1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					乳がん	
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ[Pembrolizumab]		200mg/body		点滴	Day1
備考 Pembrolizumab インラインフィルター使用 インフュージョンリアクションあればビスミラー＆カロナール投与を考慮						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00045 】		乳がん	乳癌	
Pembrolizumab/EC (術前)				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ®[Pembrolizumab]	200mg/body	点滴	Day1
	エビルビシン [EPI]	90mg/m ²	点滴	Day1
	エンドキサン [CPA]	600mg/m ²	点滴	Day1
備考				
Pembrolizumab	インラインフィルター使用 インフュージョンリアクションあればビスミラー＆カロナル投与を考慮			
EPI	生涯投与量900mg/m ²			
CPA	パル輸液セット使用 Day1-3アプレピタント内服 ※術前Pembrolizumab/PTX/CBDCA 4コース実施後4コース行う			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートをキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	15分
	エピルビシン	90mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	30分
	エンドキサン	600mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00044 】				乳がん	
Pembrolizumab/PTX/weekly CBDCA (術前)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC1.5		点滴	Day1.8.15
	パクリタキセル [PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					
Pembrolizumab インラインフィルター使用					
インフュージョンリアクションあればビスミラー&カロナール投与を考慮					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
⑥	生理食塩液	250ml	
	カルボプラチン	AUC1.5	60分
⑦	生理食塩液	100ml	

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC1.5	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00043 】				乳がん	
GEM/CBDCA/Pembrolizumab					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²		点滴	Day1.8
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC2		点滴	Day1.8
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg/body		点滴	Day1
備考					
Pembrolizumab インラインフィルター使用					
インフュージョンリアクションあればビスミラー & カロナール投与を考慮					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	キイトルーダ	200mg/body	
④	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
⑤	生理食塩液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC2	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	生理食塩液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC2	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00042 】				乳がん	
Pertuzumab/Trastuzumab(2コース目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	420mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	パージェタ	420mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	6mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00041 】				乳がん	
Pertuzumab/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	840mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	60分
	パージェタ	840mg/body	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	8mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00040 】				乳がん	
Bevacizumab (Capecitabine/S-1)					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アバスチン	[BEV]	10mg/kg		点滴 Day1
	ゼローダ	[Cap] /S-1			内服 Day1夕食後-Day15朝食後
備考					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Cap BSA1.96㎡＜：2100mg/回、1.66～1.96㎡：1800mg/回、1.36～1.66㎡：1500mg/回、 1.36㎡＞：1200mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					
S-1 BSA1.5㎡＜：60mg/回、1.25～1.5㎡：50mg/回、1.25㎡＞：40mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	10mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00039 】				乳がん	
nab-PTX/ Atezolizumab					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アブラキサン[nab-PTX]	100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	テセントリク [Atezolizumab]	840mg/body		点滴	Day1.15
備考					
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと					
Atezolizumab インラインフィルターを使用すること 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロ1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	
	テセントリク	840mg/body	60分 (注)
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	100mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	100mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00038 】				乳がん	
weeklyPTX					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用					
アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00037 】				乳がん	
nab-PTX/Bevacizumab					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アブラキサン[nab-PTX]		260mg/m ²		点滴 Day1
	アバスチン [BEV]		10mg/kg		点滴 Day1
備考					
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	260mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	10mg/kg	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00036 】					乳がん	
Trastuzumab emtansine						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	カドサイラ	[T-DM1]	3.6mg/kg		点滴	Day1
備考						
T-DM1	1回目は90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与 インラインフィルター使用					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	250ml	90分（注）
	カドサイラ	3.6mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00035 】					乳がん	
VNR						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ナベルビン[VNR]		25mg/m ²		点滴	Day1.8
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	5分
	ナベルビン	25mg/m ²	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00034 】				乳がん	
Eribulin					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ハラヴェン[Eri]		1.4mg/m ²		点滴 Day1.8
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00033 】				乳がん	
GEM					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]		1250mg/m ²		点滴 Day1.8
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00032 】					乳がん	
DTX						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル[DTX]		75mg/m ²		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00031 】				乳がん	
TC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル[DTX]		75mg/m ²		点滴 Day1
	エンドキサン [CPA]		600mg/m ²		点滴 Day1
備考					
CPA パル輸液セットを使用					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	30分
	エンドキサン	600mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00030 】					乳がん	
FEC						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エビルピシン	[EPI]	90mg/㎡		点滴	Day1
	エンドキサン	[CPA]	600mg/㎡		点滴	Day1
	5-FU		500mg/㎡		点滴	Day1
備考						
EPI 生涯投与量900mg/㎡						
CPA パル輸液セットを使用						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	15分
	エビルピシン	90mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	30分
	エンドキサン	600mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	15分
	5-FU	500mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00029 】					乳がん	
EC						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	エピルピシン[EPI]		90mg/m ²		点滴	Day1
	エンドキサン [CPA]		600mg/m ²		点滴	Day1
備考						
EPI 生涯投与量900mg/m ²						
CPA パル輸液セットを使用						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	15分
	エビルピシン	90mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	30分
	エンドキサン	600mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00028 】			乳がん		
weekly nab-PTX/Bevacizumab					
標準治療計画					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]		1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
アブラキサン[nab-PTX]		100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
アバスチン [BEV]		10mg/kg		点滴	Day1.15
登録日		備考			
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液 デキサート3.3mg	100ml 2A	30分
③	生理食塩液 アブラキサン	100ml 100mg/m ²	30分
④	生理食塩液 アバスチン	100ml 10mg/kg	90分（注）
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液 デキサート3.3mg	100ml 2A	30分
③	生理食塩液 アブラキサン	100ml 100mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00027 】				乳がん	
nab-PTX					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アブラキサン[nab-PTX]		260mg/m ²		点滴 Day1
備考					
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	260mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00026 】				乳がん	
PTX/Bevacizumab					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	90mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	アバスチン [BEV]	10mg/kg		点滴	Day1.15
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用					
アルコール注意					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	90mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	90分 (注)
	アバスチン	10mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	90mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00025 】				乳がん			
PTX（1投2休）							
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）							
抗悪性腫瘍剤		商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
		パクリタキセル[PTX]		175mg/m ²		点滴	Day1
備考							
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用							
アルコール注意							

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00024 】				乳がん	
GEM/Pertuzumab/Trastuzumab(2コース目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	420mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	ゲムシタビン[GEM]	1250mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	パージェタ	420mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	6mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00023 】				乳がん	
GEM/Pertuzumab/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	840mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	ゲムシタビン[GEM]	1250mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab	初回90分投与	忍容性確認後2回目以降は30分投与			
Pertuzumab	初回60分投与	忍容性確認後2回目以降は30分投与			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分
	パージェタ	840mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	8mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00022 】				乳がん	
Eribulin/Pertuzumab/Trastuzumab(2コース目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	420mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	ハラヴェン[Eri]	1.4mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分(注)
	パージェタ	420mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	6mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00021 】				乳がん	
Eribulin/Pertuzumab/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	840mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	ハラヴェン[Eri]	1.4mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分
	パージェタ	840mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	8mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00020 】				乳がん	
DTX/Pertuzumab/Trastuzumab(2コース目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	420mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴	Day1
	ドセタキセル[DTX]	75mg/m ²		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	60分 (注)
	パージェタ	420mg/body	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	6mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00019 】				乳がん	
DTX/Pertuzumab/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パージェタ[Pertuzumab]	840mg/body		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
	ドセタキセル[DTX]	75mg/m ²		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
Pertuzumab 初回60分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	
	パージェタ	840mg/body	60分
⑥	生理食塩液	100ml	30分
⑦	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	8mg/kg	
⑧	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00018 】				乳がん	
DTX/Trastuzumab(2コース目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]		6mg/kg		点滴 Day1
	ドセタキセル[DTX]		75mg/m ²		点滴 Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	6mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00017 】					乳がん	
DTX/Trastuzumab(初回)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]		8mg/kg		点滴	Day1
	ドセタキセル[DTX]		75mg/m ²		点滴	Day1
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	75mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	
	ハーセプチン	8mg/kg	90分
⑥	生理食塩液	100ml	

レジメン名称 【 M-00016 】					乳がん	
Eribulin/Trastuzumab(2コース目以降)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]		2mg/kg		点滴	Day1.8.15
	ハラヴェン[Eri]		1.4mg/m ²		点滴	Day1
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00015 】				乳がん	
Eribulin/Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	4mg/kg		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day8.15
	ハラヴェン[Eri]	1.4mg/m ²		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	30ml	5分
	ハラヴェン	1.4mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00014 】			乳がん	
PTX/weekly Trastuzumab(2コース目以降)				
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴 Day1.8.15
	パクリタキセル[PTX]	175mg/m ²		点滴 Day1
備考				
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与				
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用				
アルコール注意				

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00013 】				乳がん	
PTX/weekly Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	4mg/kg		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day8.15
	パクリタキセル[PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用					
アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	120分
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00012 】				乳がん	
VNR/weekly Trastuzumab(2コース目以降)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day1.8.15
	ナベルピン[VNR]	25mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	5分
	ナベルピン	25mg/m ²	
③	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00011 】				乳がん	
VNR/weekly Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	4mg/kg		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day8.15
	ナベルピン[VNR]	25mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	5分
	ナベルピン	25mg/m ²	
③	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	50ml	5分
	ナベルピン	25mg/m ²	
③	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00010 】					乳がん	
nab-PTX/weekly Trastuzumab(2コース目以降)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]		2mg/kg		点滴	Day18.15
	アブラキサン[nab-PTX]		260mg/㎡		点滴	Day1
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	260mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00009 】				乳がん	
nab-PTX/weekly Trastuzumab(初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	4mg/kg		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day8.15
	アブラキサン[nab-PTX]	260mg/m ²		点滴	Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
nab-PTX インラインフィルター使用しないこと					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	260mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00008 】				乳がん	
weeklyPTX/weeklyTrastuzumab(2コース目以降)					
1クール 7日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ハーセプチン	[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴 Day1
	パクリタキセル	[PTX]	80mg/m ²		点滴 Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用					
アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00007 】				乳がん	
weeklyPTX/weeklyTrastuzumab(初回)					
1クール 7日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]		4mg/kg		点滴 Day1
	パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴 Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用					
アルコール注意					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	30分
	ファモチジン20mg	1A	
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00006 】				乳がん		
GEM/weekly Trastuzumab（2コース目以降）						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]		2mg/kg		点滴	Day1.8.15
	ゲムシタビン[GEM]		1250mg/m ²		点滴	Day1.8
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 M-00005 】				乳がん	
GEM/weekly Trastuzumab (初回)					
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン[Trastuzumab]	4mg/kg		点滴	Day1
	ハーセプチン[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day8.15
	ゲムシタビン[GEM]	1250mg/m ²		点滴	Day1.8
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1250mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00004 】				乳がん	
Trastuzumab術前・術後補助（2コース目以降）					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ハーセプチン	[Trastuzumab]	6mg/kg		点滴 Day1
備考					
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	6mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00003 】					乳がん	
Trastuzumab 術前・術後補助（初回）						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン	[Trastuzumab]	8mg/kg		点滴	Day1
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	8mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00002 】					乳がん	
weekly Trastuzumab（2コース目以降）						
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン	[Trastuzumab]	2mg/kg		点滴	Day1
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分(注)
	ハーセプチン	2mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 M-00001 】					乳がん	
weekly Trastuzumab（初回）						
1クール 7日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ハーセプチン	[Trastuzumab]	4mg/kg		点滴	Day1
備考						
Trastuzumab 初回90分投与 忍容性確認後2回目以降は30分投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	250ml	90分
	ハーセプチン	4mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ