

レジメン名称 【 OB-00020 】				卵巣がん	
Doxorubicin/CBDCA					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ドキシル[PLD]		30mg/m ²		点滴 Day1
	カルボプラチン [CBDCA]		AUC5		点滴 Day1
備考					
PLD 総投与量 500mg/m ² を超えないこと インラインフィルター使用しないこと					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	90分
	ドキシル	30mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00019 】					卵巣がん	
DTX						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドセタキセル[DTX]		70mg/m ²		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	70mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00018 】				卵巣がん	
CPT-11					
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン[CPT-11]	100mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100mg/m ²	ルートキープ
②	生理食塩液	100mg/m ²	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	100mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100mg/m ²	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00017 】					卵巣がん	
CPT-11/CDDPip						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン	【CDDP】	60mg/m ²		点滴	Day1
	イリノテカン	【CPT-11】	60mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1 V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	60分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00016 】					卵巣がん	
CDDP(腹腔内)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	シスプラチン	[CDDP]	100mg/m ²		点滴	Day1
備考						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	100mg/m ²	30分 (腹腔内)

レジメン名称 【 OB-00015 】				卵巣がん	
AP					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アドリアシン[ADM]		60mg/m ²		点滴 Day1
	シスプラチン [CDDP]		50mg/m ²		点滴 Day1
備考					
ADM 生涯投与量 500mg/m ²					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アドリアシン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	50mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00014 】					卵巣がん	
CPT-11/CDDP						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イリノテカン	[CPT-11]	60mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	シスプラチン	[CDDP]	60mg/m ²		点滴	Day1
備考						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	60mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イリノテカン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00013 】				卵巣がん	
GEM					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]		1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]		1000mg/m ²		点滴	Day1.8.15
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00012 】				卵巣がん	
DC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ドセタキセル[DTX]		70mg/m ²		点滴 Day1
	カルボプラチン [CBDCA]		AUC5-6		点滴 Day1
備考					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	ドセタキセル	70mg/m ²	60分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	カルボプラチン	AUC5-6	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00011 】					卵巣がん	
TP (24時間)						
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル	[PTX]	135mg/m ²		点滴	Day1
	シスプラチン	[CDDA]	75mg/m ²		点滴	Day2
備考						
PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	24時間
	パクリタキセル	135mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2			
①	生理食塩液	500ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	75mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分

レジメン名称【 OB-00010 】				卵巣がん	
TP					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	シスプラチン [CDDA]	75mg/m ²		点滴	Day1
備考					
PTX DHEPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	パロノセトロン0.75mg	1V	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	シスプラチン	75mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00009 】				卵巣がん	
Doxorubicin/Bevacizumab					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドキシル[PLD]	40mg/m ²		点滴	Day1
	アバスタチン [BEV]	10mg/kg		点滴	Day1.15
備考					
PLD 総投与量 500mg/m ² を超えないこと インラインフィルター使用しないこと					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	90分
	ドキシル	40mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ
⑤	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスタチン	10mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスタチン	10mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00008 】				卵巣がん	
Bevacizumab					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	アバスチン	【BEV】	15mg/kg		点滴 Day1
備考					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	15mg/kg	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00007 】					卵巣がん	
Doxorubicin						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ドキシル[PLD]		50mg/m ²		点滴	Day1
備考						
PLD 総投与量 500mg/m ² を超えないこと インラインフィルター使用しないこと						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	90分
	ドキシル	50mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00006 】				卵巣がん	
GC/Bevacizumab					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²		点滴	Day1.8
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC4		点滴	Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg		点滴	Day1
備考					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC4	
⑤	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	15mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00005 】				卵巣がん	
GC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]		1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]		1000mg/m ²		点滴	Day1.8
カルボプラチン [CBDCA]		AUC4		点滴	Day1
備考					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC4	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00004 】					卵巣がん	
ddTC						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]		AUC5		点滴	Day1
備考						
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意						
Day1-3アプレピタント内服						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	カルボプラチン	AUC5	60分
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	パクリタキセル	80mg/m ²	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 OB-00003 】				卵巣がん	
TC/Bevacizumab					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
	アバスチン [BEV]	15mg/kg		点滴	Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
BEV 1回目は90分投与 2回目は60分投与 忍容性確認後3回目以降は30分投与					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑤	生理食塩液	100ml	90分（注）
	アバスチン	15mg/kg	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00002 】				卵巣がん		
weeklyTC						
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]		80mg/m ²		点滴	Day1.8.15
	カルボプラチン [CBDCA]		AUC2		点滴	Day1.8.15
備考						
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	パクリタキセル	80mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC2	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 OB-00001 】				卵巣がん	
TC					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	パクリタキセル[PTX]	175mg/m ²		点滴	Day1
	カルボプラチン [CBDCA]	AUC5-6		点滴	Day1
備考					
PTX DEHPフリー輸液セット インラインフィルター使用 アルコール注意					
Day1-3アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	ビスミラー5mg	1A	
	ファモチジン20mg	1A	30分
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	6A	
③	5%ブドウ糖液	500ml	3時間
	パクリタキセル	175mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	カルボプラチン	AUC5-6	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ