

レジメン名称【 US-00005 】					子宮肉腫	
ドキシソルビシン単剤						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	アドリアシン	【ADM】	60mg/m ²		点滴	Day1
備考						
ADM 生涯投与量 500mg/m ²						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アドリアシン	60mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 US-00004 】				子宮肉腫		
イホマイド						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イホマイド [IFM]		2000mg/m ²		点滴	Day1-3
備考						
IFM パル輸液セット使用						
Rp6.7 8.9同時投与						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1-3			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	ウロミテキサン400mg	1 A	
④	生理食塩液	100ml	30分
	イホマイド	2000mg/m ²	
⑤	生理食塩液	1000ml	4時間
	メイロン	20ml	
⑥	生理食塩液	100ml	30分
	ウロミテキサン400mg	1 A	
⑦	生理食塩液	1000ml	4時間
⑧	生理食塩液	100ml	30分
	ウロミテキサン400mg	1 A	
⑨	生理食塩液	1000ml	4時間

レジメン名称 【 US-00003 】				子宮筋腫	
GEM/DTX					
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	[略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン	[GEM]	900mg/m ²		点滴 Day1.8
	ドセタキセル	[DTX]	100mg/m ²		点滴 Day8
備考					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	2A	
③	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	900mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	60分
	ドセタキセル	100mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	900mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称【 US-00002 】					子宮肉腫	
I A						
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）						
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	イホマイド	【IFM】	5000mg/m ²		点滴	Day1
	アドリアシン	【ADM】	50mg/m ²		点滴	Day3
備考						
ADM 生涯投与量 500mg/m ²						
IFM パル輸液セット使用						

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	120分
	イホマイド	5000mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	120分
	ウロミテキサン	20A	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	500ml	120分
	ウロミテキサン	20A	
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day3			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1 A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アドリアシン	50mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 US-00001 】				子宮肉腫	
CyVADIC					
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	最高投与量	投与方法	投与日
	ダカルバジン[DTIC]	200mg/m ²		点滴	Day1-5
	オンコビン [VCR]	1mg/m ²		点滴	Day1.5
	エンドキサン [CPA]	400mg/m ²		点滴	Day2
	アドリアシン [ADM]	40mg/m ²		点滴	Day2
備考					
DTIC 使用時は点滴ボトル・ルートは遮光					
ADM 生涯投与量 500mg/m ²					
CPA パル輸液セット使用					
Day1-5アプレピタント内服					

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	パロノセトロン0.75mg	1V	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	ダカルバジン	200mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	30分
	オンコビン	1mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day2			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	ダカルバジン	200mg/m ²	
④	生理食塩液	500ml	60分
	エンドキサン	400mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	30分
	アドリアシン	40mg/m ²	
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day3.4			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	ダカルバジン	200mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

Day5			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	ダカルバジン	200mg/m ²	
④	生理食塩液	100ml	30分
	オンコビン	1mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ