

レジメン名称 【 P-00006 】		膵がん			
nal-IRI/フルオロウラシル/LV					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法	投与日
	フルオロウラシル		70mg/m ²	点滴	Day1
	フルオロウラシル		2400mg/m ²	点滴（ポンプ）	Day1-3
備考					
nal-IRI		70mg/m ² （UGT1A*6若しくはUGT1A1*28のホモ接合体、又はUGT1A1*6・及びUGT1A1*28ヘテロ接合体の患者は50mg/m ² に減量） 持続性嘔吐が発現するようであればアプレピタントを追加する			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	500ml	90分
	オニバイド	70mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/m ²	
⑤	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称 【 P-00005 】		膵がん	
GEM/S-1			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	フルオロウラシル	1000mg/m ²	点滴 Day1.8
	S-1	内服	Day1夕食後-15朝食後
備考			
S-1 BSA1.5m ² < : 60mg/回、1.25~1.5m ² : 50mg/回、1.25m ² > : 40mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 P-00004 】			膵がん	
mFOLFIRINOX				
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）				
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	点滴（ポンプ）	Day1-3
	イリノテカン [IRI]	150mg/m ²	点滴	Day1
	オキサリプラチン[L-OHP]	85mg/m ²	点滴	Day1
備考		Day1-3アプレビタント内服 Rp4,5同時投与		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	5%ブドウ糖液	250ml	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	120分
④	5%ブドウ糖液	250ml	
	レボホリナート	200mg/m ²	120分
⑤	生理食塩液	250ml	
	イリノテカン	150mg/m ²	120分
⑥	生理食塩液	1本（全量140ml）	
	フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間（ポンプ）

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位

レジメン名称【 P-00003 】		膵がん	
nab-PTX/GEM			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
フルオロウラシル	125mg/m ²	点滴	Day1.8.15
ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8.15
備考			
nab-PTX	インラインフィルター使用しないこと		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	生理食塩液	100ml	30分
	アブラキサン	125mg/m ²	
④	5%ブドウ糖液	100ml	30分
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	
⑤	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 P-00002 】		膵がん	
GEM			
1クール 28日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
フルオロウラシル		1000mg/m ²	点滴 Day1.8.15
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 P-00001 】			膵がん		
FOLFIRINOX					
1クール 14日（1クールに休薬期間を含む）					
抗悪性腫瘍剤	商品名	【略号】	1日投与量	投与方法	投与日
	フルオロウラシル		400mg/㎡	点滴（ボラス）	Day1
	フルオロウラシル		2400mg/㎡	点滴（ポンプ）	Day1-3
	イリノテカン	【CPT-11】	180mg/㎡	点滴	Day1
	オキサリプラチン	【L-OHP】	85mg/㎡	点滴	Day1
備考		Day1-3アプレビタント内服			
		Rp4,5同時投与			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	30分
	デキサート3.3mg	3A	
③	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	オキサリプラチン	85mg/㎡	
④	5%ブドウ糖液	250ml	120分
	レボホリナート	200mg/㎡	
⑤	生理食塩液	250ml	120分
	イリノテカン	180mg/㎡	
⑥	生理食塩液	100ml	15分
	フルオロウラシル	400mg/㎡	
⑦	生理食塩液	1本 (全量140ml)	46時間 (ポンプ)
	フルオロウラシル	2400mg/㎡	

Day3		
①	ヘパリンロック	10単位