

レジメン名称 【 B-0011 】		胆道がん	
GEM/Pembrolizumab (6週間間隔)			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1,8,22,29
キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg	点滴	Day1
備考			
day1-3 アプレピタント内服			
最大 8 コースまで			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	400mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8,22,29			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
④	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-0010 】		胆道がん	
GC/Pembrolizumab (6週間間隔)			
1クール 42日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴 Day1,8,22,29
	シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴 Day1,8,22,29
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	400mg	点滴 Day1
備考			
day1-3 アプレピタント内服			
最大 4 コースまで			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	400mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
⑥	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑧	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8,22,29			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
④	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-0009 】		胆道がん	
GEM/Pembrolizumab (3週間間隔)			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴 Day1.8
	シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴 Day1.8
	キイトルーダ [Pembrolizumab]	200mg	点滴 Day1
備考			
day1-3 アプレピタント内服			
最大 8 コースまで			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ	200mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
④	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-0008 】		胆道がん	
GC/Pembrolizumab (3週間間隔)			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタピン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8
シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴	Day1.8
キイトルーダ® [Pembrolizumab]	200mg	点滴	Day1
備考			
day1-3 アプレピタント内服			
最大 8 コースまで			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	キイトルーダ®	200mg/body	30分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
⑥	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分
⑧	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
④	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00007 】		胆道がん	
Duruvalumab			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	イミフィンジ [Duruvalumab]	1500mg	点滴 Day1
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】			
滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
③	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	1500mg/body	60分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00006 】		胆道がん	
GC/Duruvalumab			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタピン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8
シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴	Day1.8
イミフィンジ [Duruvalumab]	1500mg	点滴	Day1
備考			
day1-3 アブレピタント内服			
最大 8 コースまで			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	イミフィンジ	1500mg/body	60分
③	生理食塩液	100ml	フラッシュ
④	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
⑤	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
⑥	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑦	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分
⑧	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑨	生理食塩液	100ml	フラッシュ

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day8			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
④	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタピン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00005 】		胆道がん	
GCS			
1クール 21日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤 商品名 [略号]	1日投与量	投与方法	投与日
ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴	Day1.8
シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴	Day1.8
S-1		内服	Day1夕食後-8朝食後
備考			
S-1	BSA1.5m ² ＜：60mg/回、1.25～1.5m ² ：50mg/回、1.25m ² >：40mg/回 Day 1 夕食後からDay8朝食後まで服用(7日間内服)		

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
④	生理食塩液 500ml	500ml	
	硫酸Mg	0.4A	60分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00004 】		胆道がん	
GEM/S-1			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/㎡	点滴 Day1.8
	S-1	内服	Day1夕食後-15朝食後
備考			
S-1 BSA1.5㎡< : 60mg/回、1.25~1.5㎡ : 50mg/回、1.25㎡> : 40mg/回 Day 1 夕食後からDay15朝食後まで服用(14日間内服)			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/㎡	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00003 】		胆道がん	
GC			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴 Day1.8
	シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴 Day1.8
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
④	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑤	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
⑥	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1 A	60分
⑦	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00002 】		胆道がん	
CDDP			
1クール 21日 (1クールに休薬期間を含む)			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	シスプラチン [CDDP]	25mg/m ²	点滴 Day1.8
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8			
①	ソルアセトF	500ml	60分
②	生理食塩液	100ml	
	グラニセトロン1mg	1A	
	デキサート3.3mg	3A	30分
③	生理食塩液	500ml	
	シスプラチン	25mg/m ²	60分
④	ソルアセトF	500ml	
	KCL注20mEq	1キット	60分
⑤	生理食塩液	500ml	
	フロセミド静注20mg	1A	60分
⑥	生理食塩液	100ml	フラッシュ

レジメン名称 【 B-00001 】		胆道がん	
GEM			
1クール 28日（1クールに休薬期間を含む）			
抗悪性腫瘍剤	商品名 [略号]	1日投与量	投与方法 投与日
	ゲムシタビン[GEM]	1000mg/m ²	点滴 Day1.8.15
備考			

【注射薬投与日のタイムスケジュール】

滴下順	薬品名	用量	投与時間
Day1.8.15			
①	生理食塩液	100ml	ルートキープ
②	生理食塩液	100ml	
	デキサート3.3mg	2A	30分
③	5%ブドウ糖液	100ml	
	ゲムシタビン	1000mg/m ²	30分
④	生理食塩液	100ml	フラッシュ